

## **CUESTIONARIOS SOBRE EXPOSICIÓN AL HUMO AMBIENTAL DE TABACO EN ESPAÑA, ¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO?.**

S Manzanares; Gr de Trabajo de Tabaquismo de la Sociedad Española de Epidemiología (GTT-SEE)\*.

*UD IMAS-UPF-ASPB.*

**Antecedentes/Objetivos:** La exposición al humo ambiental de tabaco (HAT) causa cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares y otros problemas de salud. Disponer de datos de exposición a nivel poblacional es importante en términos de salud pública. Sin embargo, no existe un consenso sobre cómo recoger dicha información mediante cuestionario. El objetivo es revisar los cuestionarios de estudios españoles en los que se ha recogido la exposición al HAT

**Métodos:** Se identificaron los cuestionarios con preguntas sobre HAT a partir de la revisión de encuestas y estudios de salud locales, autonómicos y nacionales realizados en España desde 1983. Además, se realizó una búsqueda en PubMed de trabajos en castellano o inglés sin límite de fecha. Se obtuvieron los cuestionarios originales directamente de los responsables o de sus instituciones. De cada cuestionario se identificaron las preguntas sobre exposición al HAT, y se recogió información sobre el tipo de población al que estaban dirigidas (población general, escolares y otros). Cada pregunta se clasificó según el entorno en el que se medía la exposición (casa, trabajo o centro de estudios y lugares de ocio). Para cada entorno, se cuantificó el número de cuestionarios que medían duración o frecuencia de la exposición y el de los que medían intensidad.

**Resultados:** Se revisaron un total de 24 cuestionarios: 6 de ámbito local, 14 autonómicos y 4 nacionales. 17 (70,8%) cuestionarios estaban dirigidos a la población general, 5 a escolares y 2 a otras poblaciones específicas. Todos los cuestionarios recogían información sobre exposición en el hogar, 19 (83,3%) preguntaban por exposición en el trabajo y/o centro de estudios y 21 (87,5%) por exposición en lugares de ocio. Respecto a la información sobre exposición en el hogar, 23 cuestionarios (95,8%) recogían información sobre la duración y/o frecuencia y 12 sobre la intensidad de la exposición. Sobre exposición en el trabajo, 16 (84,2%) preguntaban por la duración o frecuencia de la exposición y 7 por la intensidad de ésta. En cuanto a los lugares de ocio, 20 cuestionarios (83,3%) recogían información sobre la duración y/o frecuencia de la exposición, y 3 sobre la intensidad de ésta

**Conclusiones/Recomendaciones:** Existe una amplia variedad de tipo y número de preguntas entre cuestionarios. El entorno de exposición más estudiado es el hogar. Asimismo, la duración o frecuencia de la exposición se recoge en la mayoría de cuestionarios, a diferencia de la intensidad. Sería oportuno establecer un consenso para estandarizar la medición de la exposición a HAT a través de cuestionarios en España, con el objetivo de disponer de indicadores comparables.

\*GTT-SEE: Ariza C, Fernández E, Galán I, López MJ, Moncada A, Montes A, Nebot M, Pérez-Rios M, Schiaffino A